

# Mantener a todos seguros

## Detener la propagación de la COVID-19

Desde que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) y la Organización Mundial de la Salud comenzaron a brindar consejos sobre cómo lidiar con la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), las clínicas de diálisis, al igual que todos los proveedores de atención médica, han implementado muchos procesos nuevos para prevenir y detener la propagación de la COVID-19. Las clínicas de diálisis están tomando estas medidas para asegurarse de poder brindar atención de diálisis segura a todos los pacientes. Los CDC han compartido la preocupación de que "las personas con enfermedad renal crónica sometidas a diálisis" puedan tener un mayor riesgo de sufrir una enfermedad grave a causa de la COVID-19.<sup>[1]</sup>




## Riesgos para las personas con ESRD

**4.5 veces**

**más probabilidades de contraer COVID-19**

**8 veces**

**más probabilidades de ser hospitalizado con COVID-19**



En comparación con las personas que reciben Medicare debido a su edad, una persona con enfermedad renal terminal (End-stage Renal Disease, ESRD) tiene 4.5 veces más probabilidades de contraer COVID-19 y 8 veces más probabilidades de ser hospitalizada debido a la COVID-19.<sup>[2]</sup>

## ¿Por qué utilizar una cubierta facial?

Puede infectarse al entrar en contacto cercano (6 pies o menos) con una persona que tiene COVID-19.



Puede infectarse a través de gotitas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.

Las personas que tienen el virus, pero no presentan síntomas, se conocen como asintomáticas y pueden transmitir el virus a otras personas.

## Estamos juntos en esto

Protéjase protegiendo a su vecino. Use una cubierta facial correctamente:

- Lávese las manos antes de ponerse la cubierta facial.
- Use una cubierta facial que cubra la nariz y la boca y asegúrela debajo de la barbilla.
- Colóquela de manera ajustada contra los lados de su cara.
- Mantenga su cara cubierta todo el tiempo que esté en la clínica de diálisis y en público.
- No se ponga la cubierta alrededor del cuello ni sobre la frente.
- No toque la cubierta facial y, si lo hace, lávese las manos.

[1] [https://www.cms.gov/blog/medicare-covid-19-data-release-blog#\\_ftn1](https://www.cms.gov/blog/medicare-covid-19-data-release-blog#_ftn1) People Who Are at Higher Risk for Severe Illness – Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html> (consultado: 18 de junio de 2020)

[2] <https://www.cms.gov/research-statistics-data-systems/preliminary-medicare-covid-19-data-snapshot>. Resumen de datos preliminares sobre la COVID-19 de Medicare del 1.º de enero al 20 de junio de 2020 (17 de julio de 2020).

Para obtener más información o presentar una queja, comuníquese con:

ESRD Network 10  
911 E. 86th St., Suite 30  
Indianapolis, IN 46240  
Línea gratuita: (800) 456-6919

ESRD Network 12  
2300 Main St., Suite 900  
Kansas City, MO 64108  
Línea gratuita: (800) 444-9965

